

VTÁČIA CHRÍPKA – ČO TREBA VEDIETĽ A ROBIŤ



Ilustračné foto

V prípade, že vo svojom okolí objavíte uhynutého divo žijúceho vtáka z radu vodných vtákov, prípadne exotických vtákov odporúča sa:

- **Nedotýkať sa uhynutého vtáka.**
- **Informovať o náleze príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Žilina (RvaPS), ktorej pracovníci vykonajú príslušné opatrenia.**
- **kontakt: 041/763 2963, 041/763 1235**

Informácie o vtácej chrípke a epidemiologickej situácii vo výskyte vtácej chrípky nájdete na WEB stránke:

www.svssr.sk/zvieratachoroby_chripka.asp

OPATRENIA PRI VÝSKYTE

Ak by sa nákaza vyskytla v chove hydiny bude nariadené usmrtiť všetku hydinu v chove. Uhynutá alebo usmrtená hydina a všetky vajcia musia byť zneškodnené tak, aby sa znížilo riziko šírenia choroby na minimum. Ďalej bude nevyhnutné zneškodniť alebo vhodne ošetriť všetok materiál a všetky odpady, ktoré môžu byť kontaminované. Taktiež sa zrealizuje vyhl'adanie a zničenie hydínového mäsa pochádzajúceho zo zvierat z príslušného chovu a násadových vajec znesených v období predpokladanej inkubačnej doby. Po týchto činnostiach bude následne urobená očista a dezinfekcia budov využívaných na ustajnenie hydiny, ich okolia, dopravných prostriedkov a všetkého materiálu, ktorý môže byť kontaminovaný. Zároveň sa okolo infikovaného chovu určí ochranné pásmo s minimálnym polomerom 3 km a pásmo dohl'adu s minimálnym polomerom 10 km, kde budú stanovené ďalšie ochranné opatrenia :

- použitie vhodných dezinfekčných prostriedkov pri vstupoch a výstupoch z chovov;
- pravidelné kontroly všetkých chovov hydiny;
- kontrolu činnosti osôb, ktoré manipulujú s hydinou;
- zákaz odsunu hydiny a násadových vajec z chovov;
- zákaz vyvážania alebo rozhadzovania použitej podstielky a hnoja hydiny bez povolenia a ďalšie.

V prípade potvrdenia výskytu u voľne žijúcich vtákov sa realizujú opatrenia taktiež v pásmach 3km a 10 km od miesta výskytu.

PREVENCIA

V **chovoch hydiny** je mimoriadne dôležité zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov, zvlášť vodného vtáctva s hydinou. Zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej. Novo nakúpenú hydinu umiestniť do priestorov, ktoré boli vopred vyčistené a dezinfikované.

Zabezpečiť kŕmenie a napájanie hydiny v uzavretom priestore alebo pod prístreškom, ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu. Bezodkladne oznamovať príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek klinické príznaky vtácej chrípky u hydiny. U ľudí je dôležité pri nájdení uhynutých vtákov nedotýkať sa nálezu („kadáver“) a túto skutočnosť nahlásiť kompetentným pracovníkom, správne používať osobné ochranné pomôcky, dodržiavať hygienické návyky.

zdroj: OÚ Lietava